

Cicadelles vertes

Deux cicadelles vertes parasitent les pêchers et les abricotiers :

- *Asymmetrasca decedens*
- *Empoasca vitis*.

Ces 2 ravageurs, très proches morphologiquement et avec des cycles biologiques comparables, parasitent les pêchers et les abricotiers de mi-juin à octobre en réalisant 2 à 3 générations.

Les dégâts sont essentiellement préjudiciables aux jeunes vergers ou aux surgreffages. Les piqûres d'alimentation se concentrent sur l'apex et occasionnent des dégâts en ralentissant la pousse et en provoquant des nécroses marginales sur les feuilles.

Les débuts d'attaques, qui se caractérisent par des enroulements de feuilles, sont parfois confondus avec des débuts d'infection d'oïdium. La détection est facile. En remuant la frondaison des arbres, on observe les cicadelles qui s'envolent des arbres.



Lutte insecticide

Les traitements insecticides contre d'autres ravageurs sur jeunes vergers sont souvent suffisants pour maintenir la population à un niveau correct. Sur vergers adultes, aucune intervention n'est nécessaire. L'insecte est tolérable dans la plupart des cas.

Lutte indirecte

Cet insecte très polyphage est également présent sur un ensemble important de plantes herbacées. Il importe de maîtriser l'enherbement et de bien nettoyer, lorsque cela est possible, les abords des vergers.