



# Châtaigne

## N°10

08/09/2016



**Animateur filière**  
Raphaël RAPP  
CHAMBRE REGIONALE ALPC  
[raphael.rapp@alpc.chambagri.fr](mailto:raphael.rapp@alpc.chambagri.fr)

**Directeur de publication**  
Dominique GRACIET  
Président de la Chambre  
Régionale d'Agriculture Aquitaine  
Limousin-Poitou-Charentes  
Boulevard des Arcades  
87060 LIMOGES Cedex 2  
[accueil@alpc.chambagri.fr](mailto:accueil@alpc.chambagri.fr)

**Supervision**  
DRAAF  
Service Régional de  
l'Alimentation Aquitaine-  
Limousin-Poitou-Charentes  
22 Rue des Pénitents Blancs  
87000 LIMOGES

Reproduction intégrale  
de ce bulletin autorisée.  
Reproduction partielle  
autorisée avec la mention  
« extrait du bulletin de santé  
du végétal Grand Sud-Ouest  
Châtaigne N°10  
du 08/09/2016 »



**Bulletin disponible sur les sites :**

[www.aquitainagri.fr](http://www.aquitainagri.fr) ; [www.limousin.synagri.com](http://www.limousin.synagri.com) ; [www.fredon-limousin.fr](http://www.fredon-limousin.fr) ;  
[www.mp.chambagri.fr](http://www.mp.chambagri.fr)

**et sur le site de la DRAAF**

[www.draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr)

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT :**

- [Aquitaine : Formulaire d'abonnement au BSV](#)
- [Poitou-Charentes : www.bsv-pc.fr](http://www.bsv-pc.fr)
- [Limousin sur demande : nathalie.magnin@alpc.chambagri.fr](mailto:nathalie.magnin@alpc.chambagri.fr)
- [Midi-Pyrénées : www.bsv.mp.chambagri.fr](http://www.bsv.mp.chambagri.fr)

## Ce qu'il faut retenir


- **Carpocapse du châtaignier** : Second et dernier pic de vol passé.  
Le risque d'éclosions est toujours en cours.

### • Carpacse de la châtaigne (*Cydia splendana*)

*Cydia splendana* est un petit papillon nocturne de couleur grise ou gris clair (deux formes existent). Pour l'identifier : **Ailes antérieures gris cendré traversées de fines lignes claires** ; à l'angle postérieur, une tache gris argenté bordée de brun et renfermant 4 petits traits noirs.

### Observations du réseau

Remontée des piégeages : fin du second pic de vol. Vol très similaire à celui de 2014, d'une semaine plus précoce que celui de 2015.



### Evaluation du risque – carpacse du châtaignier

**Le risque d'éclosions est toujours en cours.**

Néanmoins, le vol devrait progressivement diminuer d'intensité sur le mois de septembre.

**Rappel de biologie** : La ponte débute quelques jours après la sortie des femelles. **L'éclosion débute 10 à 12 jours après la ponte**. La larve peut atteindre jusqu'à 12 à 16 mm et présente une couleur blanche ou rosée en fin de développement. Elle passe par plusieurs stades larvaires :

- *Le stade baladeur* : la chenille accède à la bogue en circulant sur le feuillage et les rameaux. Elle y pénètre jusqu'à l'intérieur de la châtaigne.
- *5 stades larvaires* : la chenille poursuit sa croissance dans le fruit pendant 40 à 45 jours, durant lesquels elle se nourrit de l'amande et creuse une galerie qui contient ses excréments.
- *À la fin de sa croissance*, la larve perce l'enveloppe de la châtaigne et s'enfonce dans le sol. Elle tisse un cocon (hibernaculum) et entre en diapause pour se métamorphoser l'été suivant.

## Prochain bulletin : fin septembre

### Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Grand Sud-Ouest Châtaigne sont les suivantes :

Chambre régionale d'agriculture ALPC, Fredon Limousin, Chambres départementales d'agriculture de la Dordogne, de la Corrèze et du Lot, CAPEL, Périgourdine, SCA SOCAVE, LIMDOR, Ecolim, Invenio et les agriculteurs observateurs.

*Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).*

*" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l'écologie, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto "*