



## A retenir

- VERS DE LA GRAPPE** Période de vol et de ponte de G3 en cours en toutes situations. Restez vigilants tout au long de la période de risque qui est souvent très étalée sur cette dernière génération.
- BOTRYTIS** Avec le retour des pluies, les conditions deviennent favorables au développement du champignon. Surveillance accrue sur toutes les situations à risque.  
Ne négligez pas la prophylaxie.
- MILDIU** Conservez un bon état du feuillage car la récolte est encore lointaine
- FLAVESCENCE DOREE** En conventionnel, le T3 est à réaliser selon analyse de risque, entre le 2 et le 20/08  
Début de la période de prospection

**A l'approche de la récolte, veillez au respect des DAR**

## METEO

### • Prévisions du 21 au 26 août 2019

	Mer 21	Jeu 22	Ven 23	Sam 24	Dim 25	Lun 26
<b>Températures</b>	11-26	13-28	13-31	15-33	16-28	15-29
<b>Tendances</b>						

## STADES PHENOLOGIQUES

Cépage	Stade moyen
Chardonnay	37
Gros Manseng	34-35
Colombard	36-37
Ugni Blanc	34-35
Merlot	35-36
Tannat	35-36
Cabernet Sauv	34-35

### Stades (Echelle Eichhorn et Lorenz) :

- 33 : fermeture de la grappe  
34 : 1ers grains vérés  
35 : début véraison  
36 : mi-véraison  
37 : fin véraison

La progression de la véraison reste lente. Le profil tardif de l'année semble se confirmer, malgré l'effet positif des dernières pluies.



Directeur de publication :

Denis CARRETIER  
Président de la Chambre  
Régionale d'Agriculture  
d'Occitanie  
BP 22107  
31321 CASTANET  
TOLOSAN Cx  
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :  
Chambre d'agriculture du  
Gers, Chambre régionale  
d'Agriculture d'Occitanie,  
DRAAF Occitanie

## MILDIOU (*Plasmopara viticola*)

---

### • Situation au vignoble

Le vignoble est globalement sain malgré une présence fréquente de symptômes sur feuilles. Du mildiou mosaïque est visible régulièrement. Sa progression a pu être favorisée par les matinées humides.

**Évaluation du risque :** Pour les parcelles les plus avancées, la véraison marque la fin de la période de sensibilité des grappes.

Toutefois, pour les situations les plus tardives où la véraison est encore timide, il convient de rester vigilants à l'évolution de l'état sanitaire des grappes si la maladie est déjà présente. Surveillez l'éventuelle apparition de nouveaux dégâts suite aux pluies de ce début de semaine.

A ce rythme, la récolte est encore lointaine. Il convient donc de rester vigilant à l'évolution de l'état sanitaire du feuillage qui doit permettre une alimentation suffisante des grappes.

Veillez également à la qualité sanitaire du feuillage des jeunes plantations dont l'état va conditionner une bonne mise en réserve.

**Mesures prophylactiques :** Afin de limiter l'impact des sorties sur jeunes feuilles, un rognage peut être réalisé.

## OÏDIUM (*Erysiphe necator*)

---

### • Situation au vignoble

La maladie n'a quasiment pas été observée cette année.

**Évaluation du risque :** Les attaques d'oïdium sont restées ponctuelles. La période de risque se termine avec la véraison.

## BLACK ROT (*Guignardia bidwellii*)

---

### • Situation au vignoble

Globalement, le vignoble est sain.

Mais sur les situations à historique, les grains atteints sèchent et tombent pour la plupart.

**Évaluation du risque :** La période de risque de contamination est terminée pour une majorité des situations.

Mais, pour les parcelles déjà atteintes et plus tardives, il serait plus prudent de continuer à surveiller l'évolution des symptômes suite aux pluies du mois d'août. Une vigilance sans faille doit être maintenue jusqu'à la fin de la véraison.

## BOTRYTIS (*Botrytis cinerea*)

---

### • Situation au vignoble

Les foyers de maladies déjà visibles sur les chardonnay sont toujours actifs.

Et de nouveaux foyers apparaissent désormais plus régulièrement, notamment dans les parcelles vigoureuses et pour les cépages sensibles et les plus avancés dans la véraison comme colombar et sauvignon.

**Évaluation du risque:** Le stade « Véraison » est un des stades clef dans la gestion du Botrytis. Plusieurs facteurs de risque sont à prendre en compte, notamment la compacité des grappes et

les éclatements de baies ou encore les dégâts d'eudémis, comme autant de portes d'entrée pour la maladie.

La récolte est encore lointaine, restez donc vigilants. Surveillez attentivement l'évolution de l'état sanitaire des parcelles à risque suite aux pluies de ce début de semaine. Et redoublez de soins autour de tous les leviers prophylactiques et soignez la gestion des vers de grappe.

#### Mesures prophylactiques :

- Favoriser l'aération des grappes en pratiquant l'effeuillage pour créer un micro-climat défavorable au champignon
- Limiter les portes d'entrée par une bonne gestion du risque vers de grappe

## VERS DE LA GRAPPE *(Lobesia botrana)*

### • Situation au vignoble

Le vol est toujours actif en toutes situations. Et on observe toujours des pontes récentes en ce début de semaine.

**Évaluation du risque** : Le vol de G3 est en cours et l'activité de ponte est confirmée.

Comme il est de coutume de le rappeler à cette période, l'activité de la G3 est très étalée. La période de risque est donc longue.

Ne relâchez pas votre vigilance. Une observation précise des pontes est nécessaire (fréquence, stade, viabilité) pour évaluer le niveau de risque et juger de l'efficacité d'une stratégie déjà positionnée et la nécessité de la renouveler.

Attention aux cépages tardifs et sensibles comme le Fer pour lequel la récolte est encore lointaine et le risque sera à gérer au plus près pendant toute cette période critique.

**Attention, la G3 peut être très étalée et générer une surveillance jusqu'en septembre.**

## FLAVESCENCE DOREE

**Évaluation du risque** : Période de prospection en cours.

**T3 selon  
analyse de  
risque**

**en conventionnel** : à réaliser sur les populations adultes, selon analyse de risque : **du 2 au 20 août**  
**en AB** : 10j après le T2 = **période terminée**

Le T3 doit être effectué dans les situations suivantes : vigne-mères, présence de pieds atteints de Flavescence dorée détectés dans les parcelles ou dans l'environnement des parcelles lors de la prospection 2018, présence de friches de vigne dans l'environnement proche...

La liste des communes concernées et les modalités d'intervention sont données dans l'arrêté préfectoral consultable en mairie et sur le site de la DRAAF Occitanie : [lien vers la liste de communes](#)

**Pour plus d'informations, consulter le site de la DRAAF Occitanie :**

<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Les-Jaunisses-de-la-vigne,979>

### ***Ce bulletin est le dernier de la saison – Bonne fin de campagne !***

**REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISEE SEULEMENT DANS SON INTEGRALITE (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)**

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre d'Agriculture du Tarn et élaboré sur la base des observations réalisées par Areal, la Chambre d'Agriculture du Gers, Les Hauts de Montrouge, les Ets Ladevèze, OGR, les Producteurs Plaimont, la SICA Altema, les Silos Vicois, Val de Gascogne, les Vignerons du Gerland, Vivadour, VitiVista et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.